Aufgabe 36. Beweisen Sie: Für jeden dreiecksfreien planaren Graphen $G = (V, E)$ mit $|V| \geq 3$ Knoten gilt $|E| \leq 2|V| - 4$. Folgern Sie daraus, dass $K_{3,3}$ nicht planar ist. (Ein Graph heißt *dreiecksfrei*, wenn er keinen zu K_3 isomorphen Teilgraphen enthält.)

Aufgabe 37. Berechnen Sie für folgende Zahlenpaare (a, b) jeweils den größten gemeinsamen Teiler d und finden Sie $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $d = ax + by$.

(a) $a = 2448$ und $b = 264$.

(b) $a = 1229$ und $b = 282$.

Aufgabe 38. (a) Sind $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a \geq b$ und gilt $a = bq + r$ mit $q, r \in \mathbb{N}_0$ und $r < b$, so ist

$$br \leq \frac{ab}{2}.$$

(b) Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a > b$. Zeigen Sie, dass der euklidische Algorithmus zur Berechnung von $\text{ggT}(a, b)$ höchstens $\log_2(a) + \log_2(b)$ Schritte (=Divisionen mit Rest) benötigt.

Aufgabe 39. Für $a \in \mathbb{N}$ sei $T_{<}(a) := \{d \in \mathbb{N} : d \mid a \text{ und } d < \sqrt{a}\}$ und $T_{>}(a) := \{d \in \mathbb{N} : d \mid a \text{ und } d > \sqrt{a}\}$. Zeigen Sie:

(a) Es gibt eine bijektive Abbildung zwischen $T_{>}(a)$ und $T_{<}(a)$.

(b) Eine Zahl $a \in \mathbb{N}$ ist genau dann eine Quadratzahl, wenn $|T(a)|$ ungerade ist.

Auf der Rückseite finden Sie noch eine freiwillige Zusatzbeschäftigung für die Weihnachtsferien.
(Wir werden diesen Zusatz in den Übungen nicht besprechen.)

(Satz von Lamé) Im Folgenden untersuchen wir die Laufzeit des euklidischen Algorithmus noch einmal etwas genauer und beweisen den entsprechenden Satz von Lamé. Die Fibonacci Zahlen F_n , $n \geq 1$, sind rekursiv definiert durch $F_1 = F_2 = 1$ und $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ für $n \geq 3$. Zeigen Sie:

- (a) Der euklidische Algorithmus benötigt $n - 1$ Schritte um $\text{ggT}(F_{n+1}, F_n)$ zu berechnen (für $n \geq 2$) und es gilt $\text{ggT}(F_{n+1}, F_n) = 1$.
- (b) Angenommen es gilt $a > b > 0$ und der auf a und b angewendete euklidische Algorithmus benötigt zumindest n Schritte. Dann gilt $b \geq F_{n+1}$ und $a \geq F_{n+2}$.
- (c) Für jedes $n \geq 1$ gilt

$$F_n \geq \varphi^{n-2} \quad \text{wobei} \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

und für $n \geq 3$ gilt die strikte Ungleichung (Induktion nach n , es gilt $\varphi^2 = \varphi + 1$).

- (d) Ist $a > b > 0$, so benötigt der euklidische Algorithmus höchstens

$$5 \log_{10}(b) + 1 \leq 5(\lfloor \log_{10}(b) \rfloor + 1)$$

Schritte um $\text{ggT}(a, b)$ zu berechnen.

Bemerkung.

- $\lfloor \log_{10}(b) \rfloor + 1$ ist die Anzahl der Stellen in der Dezimaldarstellung der kleineren der beiden Zahlen, b .
- Mit $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ gilt

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\varphi - \psi} = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} \leq \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \approx \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}}$$

für alle $n \geq 1$. (Diese Formel kann man leicht mittels Induktion beweisen; um sie aus der Definition von F_n zu berechnen, wenn man sie nicht kennt, benötigt man aber etwas mehr an Methoden.) Dann ist

$$5 \log_{10}(F_n) + 1 \approx n \log(\varphi) - \log(\sqrt{5}) + 1 \approx 1.045n + 0.651.$$

Tatsächlich brauchen wir $n - 1$ Schritte um $\text{ggT}(F_{n+1}, F_n)$ zu berechnen.